



Mia Klement

PIKA POREMЕСАJ*



Što je Pika poremećaj?

Ljudi s ovim poremećajem kompulzivno jedu predmete koji nemaju hranjivu vrijednost te tako ugrožavaju zdravlje.

[Pika poremećaj](#) spada u poremećaje prehrane kod kojeg oboljele osobe jedu obično jedu bezopasne predmete bez hranjive vrijednosti, ali postoje i oni koji se ‘hrane’ opasnim tvarima i predmetima.

Osoba s pikom tako osjeća glad prema, primjerice, ledu ili pak komadićima sasušene boje, ostacima papira, kovanicama ili piljevini.

Ovaj [poremećaj](#) javlja se najčešće kod trudnica i djece i obično je privremene prirode, ali može se javiti i kod osoba s intelektualnim teškoćama te i posebno

Uzroci Pika poremećaja

Nedostatka hranjivih tvari	Pothranjenost	Psihičke bolesti	Dijeta za mršavljenje
<ul style="list-style-type: none">• poput cinka i željeza pa, primjerice, anemija može uzrokovati pika poremećaj u trudnica	<ul style="list-style-type: none">• u nerazvijenim zemljama gdje nema dovoljno hrane i vode pa osobe jedu zemlju ili glinu	<ul style="list-style-type: none">• opsesivno-kompulzivni poremećaj, šizofrenija	<ul style="list-style-type: none">• da bi zatomile osjećaj gladi, osobe koje drže <u>dijetu</u> počinju jesti nehranjive predmete

Kako prepoznati pika poremećaj?

čudno ponašanje koje uključuje često stavljanje u usta sljedećih tvari

konstantno jede: led, sapun, pjesak, šljunak, zemlju, opuške, piljevinu, papir, kredu, ljepilo, kosu, glinu, kovanica ili gumbi, boju, izmet


ponašanje mora trajati barem mjesec dana da bi se kvalificiralo kao takvo.

može dovesti do ozbiljnim posljedica poput trovanja, gušenja, nadražaja probavnog sustava, trovanja olovom, parazitskih infekcija i slično

probavne smetnje – Bol u želucu, zatvor, proljev ili druge gastrointestinalne tegobe

oštećenje zuba i probavnog trakta – Konzumacija tvrdih ili oštrih predmeta može izazvati lomljenje zuba ili ozljede jednjaka i crijeva

Primjeri Pike



0
1
0
2
0
3

- Dijete od 4 godine redovito jede kredu i papir u vrtiću, što dovodi do želučanih problema.
- Dijete s deficitom željeza ima neodoljivu potrebu gristi led i jesti pjesak s igrališta.
- Starija osoba s demencijom neprestano jede papirnate ubruse, ne shvaćajući da nisu hrana.

Dijagnoza i liječenje

Psihoterapiju, posebno kognitivno-bihevioralnu terapiju (KBT) za kontrolu kompulsivnih ponašanja..

Medicinsku intervenciju ako postoji komplikacije poput trovanja


Suplementaciju željeza, cinka i drugih nutrijenata.

- Dijagnoza se postavlja na temelju anamneze, liječničkog pregleda i laboratorijskih testova za identifikaciju nutritivnih deficitova.



Zaključak

- Pika je ozbiljan poremećaj hranjenja koji može imati štetne posljedice po zdravlje.
- Pravovremena dijagnoza i odgovarajući tretman mogu značajno poboljšati kvalitetu života oboljelih.
- Edukacija o ovom poremećaju i razumijevanje njegovih uzroka ključni su za prevenciju i liječenje.



KRAJ!

